



Vinogradništvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, na Goriškem ob šibki burji do 37 °C.

Jutri bo sončno in vroče, pozno popoldne v Alpah lahko nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 36 °C.

OPOZORILO Danes bo sredi dneva in popoldne predvsem po nižinah Primorske velika toplotna obremenitev, jutri pa tudi drugod po nižinah. V večjem delu Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti V petek dopoldne bo še večinoma sončno in vroče. Popoldne se bodo v notranjosti pojavljale krajevne plohe in nevihte, ob tem bo zapihal severni veter. V soboto bo dokaj sončno, vročina bo v notranjosti popustila.

Vremenska slika Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam doteka dokaj suh in postopno spet bolj vroč zrak. .

*Vir: ARSO, sredi, 02. julij 2025 ob 13:00

SVETOVANJE

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska
Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška
Matej Ščuka, mag. ing. agr.
031 316 296, matej.scuka@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija
Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Podravska in pomurska regija
Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Marketing in razvoj
Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si



Varstvo trte

Varstvo trte pred ameriškim škržatkom

Po napovedih lokalnih svetovalnih služb za varstvo rastlin, bo v prihodnjih tednih potrebno opraviti **"drugo obvezno zatiranje" ameriškega škržatka**. V nasade je že bilo potrebno obesiti rumene lepljive plošče, kako pa izgledajo različni razvojni stadiji ameriškega škržatka, pa najdete na tej povezavi <https://shorturl.at/LJLYh>. Datumi zatiranja po posameznih območjih:

- **Podravski vinorodni rajon** (Štajerska in Prekmurje):
do 13. julija
- **Celjska regija** (območje občin Slovenske Konjice, Oplotnica, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Zreče, Vojnik, in Šentjur):
od 9. - 20. julija
- **Posavje, Dolenjska in Bela krajina:**
do 12. julija
- **Primorska:**
trenutno datuma še ni; spremljajte obvestila KGZ Nova Gorica

Priporočilo:

- **Mavrik 240 EW v odmerku 200 mL/ha** (20 mL/100 L). Vodo za škropljenje, razen deževnice, je potrebno zakisati, tako da je njena vrednost pH manj kot 6,5. To dosežemo s sredstvom **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**. V ta namen pa lahko uporabite tudi kisli foliarni gnojili, kot so **Magnesiogreen** ali **Karsia Fosfor** ali **Karsia Mangan**.

Opozorilo: sredstvo **Mavrik 240 EW** kot samo ni nevarno za čebele, v primeru kombinacije s triazolnimi fungicidi pa se njegova strupenost poveča. Zato svetujemo, da v času tega ukrepa proti **oidiju** uporabite fungicide kot so **Talendo** ali **Karathane Gold** ali močljivo žveplo **Colpenn 80 WG** eko. Pred uporabo insekticida je potrebno cvetočo podrast v vinogradu in bližnji okolici pokositi oziroma na drug način preprečiti, da bi jo insekticid dosegel.



Odrasli škržatek na RLP



Mavrik 240 EW 200 mL in 1 L

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin.

V ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L**. Sredstvo je dovoljeno tudi v ekološki pridelavi.



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**. V takem primeru se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres.

Sredstva na osnovi aminokislin:

- **Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- **Goëmar BM 86**  **v odmerku 3,0 L/ha** (300 mL/hL)
- **ExelGrow** v odmerku **1,0 L/ha** (1000 mL/hL)



Protifert LMW in Drin



ExelGrow in Goëmar BM 86

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.