




Sadjarstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo sprva oblačno. Dež se bo od severa razširil nad večji del Slovenije in dopoldne postopno ponehal. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Popoldne se bo delno razjasnilo, predvsem na zahodu ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem okoli 26 °C.

Ponoči se bo oblačnost spet povečala, predvsem v zahodnih krajih bodo možne krajevne plohe.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 19 do 24 °C.

Obeti V nedeljo bo razmeroma sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Več kopaste oblačnosti bo čez dan v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo povečini sončno.

Vremenska slika

Oslabljen hladna fronta je od severa dosegla Alpe in bo dopoldne prešla naše kraje. Za njo bo k nam z vetrovi severnih smeri dotekal nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

*Vir: ARSO, petek, 22. avgusta 2025 ob 06:00

SVETOVANJE

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. ing. agr.

051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška

Matej Ščuka, mag. ing. agr.

031 316 296, matej.scuka@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.

041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.

031 394 227, drago.majcen@karsia.si

Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)

041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.

041 689 120, marketing@karsia.si

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si

Varstvo pečkarjev

Jablanov škrlup

Zadnje padavine so končno vsaj malo ublažile to sušno obdobje, ki pa je na nekaterih kulturah povzročila nepopravljivo škodo. Seveda pa so te padavine ponovno omogočile pogoje za sekundarne okužbe plodov s poznim jablanovim škrlupom, še posebej v sadovnjakih z aktivnimi pegami v vrhovih krošenj. Pri izbiri fungicidov moramo biti pozorni na karenco, saj fungicidi na osnovi kaptana sedaj pridejo v poštev le še za zelo pozne sorte. **Priporočilo:**

- **Karbicare**  **v odmerku 5,0 kg/ha** (500 g/hL) (karenca 1 dan). V primeru okužbe ga uporabimo najkasneje 8 ur po nastopu, saj takrat zagotavlja odlično učinkovitost.
- **Vacciplant**  **v odmerku 1,3 L/ha** (130 mL/hL) (karenca ni potrebna). Deluje kot spodbujevalec naravne odpornosti rastlin, tako da aktivira obrambne mehanizme.
- **Merpan 80 WDG** **v odmerku 1,88 kg/ha** (karenca 28 dni) (188 g/100L) za pozne sorte, ki se bodo pričele obirati v drugi polovici meseca septembra in kasneje.



Škrlup



Grenka gniloba

Grenka gniloba jabolk - Gloeosporium

Gre za gospodarsko pomembno bolezen, ki se pojavlja na vseh območjih pridelovanja. Najbolj občutljive sorte so zlati delišes, mutsu, jonagold, braeburn in fuji. Brez uporabe učinkovitih fungicidov lahko že v nekaj tednih toplega in vlažnega vremena povzroči propad pridelka.

Priporočilo:

- **Vacciplant**  **v odmerku 1,3 L/ha** (130 mL/hL).



Vacciplant in Merpan 80 WDG



Karbicare

Varstvo pečkarjev

Preprečevanje odpadanja plodov

Odpadanje plodov je predvsem posledica neugodnih klimatskih razmer, kot so visoke temperature in pomanjkanje talne vlage, kar sili rastline v prisilno dozorevanje. Za omilitev predčasnega odpadanja plodov se lahko uporabijo sredstva na osnovi NAA. **Priporočilo:**

- **Obsthormon 24 A** (karenca 7 dni) v odmerku do 240 mL/10.000 m² tretirane listne površine. Sredstvo lahko uporabite 1-2-krat, presledek naj bo 7 dni.



Predčasno odpadanje plodov



Obsthormon 24a

Foliarna prehrana pečkarjev

Prehrana s kalcijem (Ca)

Za preprečevanje **grenke pegavosti** in dviga kvalitete plodov svetujemo sprotno dodajanje kalcija. **Priporočilo:**

- **Karsia Kalcij**  v odmerku **5,0-10 L/ha** (0,5-1,0 L/hL)

Prehrana s fosforjem (P)

Fosfor prav tako vpliva na **obarvanost plodov**, kar je še posebej pomembno v toplih poletjih in jeseni. Fosfor poviša vsebnost encima, ki sodeluje pri tvorbi antocianov, ki so osnova za **rdečenje plodov**, se pa uporablja izmenično s kalcijevimi gnojili. Fosfor je prav tako zelo pomemben, saj njegovo dodajanje pozitivno vpliva na **diferenciacijo rodni brstov**. **Priporočilo:**

- **Karsia Fosfor** v odmerku **3,0-5,0 L/ha**



Lepo prehranjen plod




Karsia Kalcij in Karsia Fosfor

Varstvo in prehrana oljk

Oljčna muha

V zadnjih dneh se opaža povečan let **oljčne muhe**, še močnejši pa bo verjetno po teh padavinah. Na določenih lokacijah se je povečal ulov **orehove muhe**, zato svetujemo ažurno spremljanje in po potrebi ukrepanje. Pojavnost oljčne muhe lahko spremljate na Agrometeorološkem portalu <https://agromet.mkgp.gov.si/APP2/Zoo?id=1>
Priporočilo:

- **Mospilan 20 SG v odmerku 300 g/ha** (30 g/hL) (karenca 28 dni), ki ga uporabimo v primeru, da smo opazili jajčeca in ličinke ali
- **GF-120** (karenca 7 dni) **v odmerku 1-1,2 L/ha** pri porabi čim manjše količine vode (uradno priporočilo 10-30 L/ha) oz. pri porabi največ 0,1 L škropilne brozge na drevo, pri gostoti sajenja 300 dreves/ha.



Orehova muha na plodu

Prehrana z bakrom (Cu)

Baker kot hranilo deluje tako, da poviša odpornost rastlin. **Priporočilo:**

- **Karsia Baker v odmerku 3,0 L/ha** (300 mL/100 L).



Mospilan 20 SG in GF-120

Prehrana s fosforjem (P) in kalijem (K)

Obe hranili vplivata na povišanje kvalitete, pospešujeta dozorevanje in pozitivno vplivata na odpornost rastlin. **Priporočilo:**

- **Hascon M10AD v odmerku 3-5 L/ha** (300-500 mL/100 L).



Karsia Baker in Hascon M10AD

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin.

V ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L**. Sredstvo je dovoljeno tudi v ekološki pridelavi.



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**. V takem primeru se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres.

Sredstva na osnovi aminokislin:

- **Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- **Goëmar BM 86**  **v odmerku 3,0 L/ha** (300 mL/hL)
- **ExelGrow**  **v odmerku 1,0 L/ha** (1000 mL/hL)



Protifert LMW in Drin



ExelGrow in Goëmar BM 86

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.