



Poljedelstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 °C.

Jutri bo precej jasno, popoldne v zahodnih krajih ponekod zmerno oblačno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 28 °C.

Obeti V sredo in v četrtek bo povečini sončno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno. V Posočju bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Vremenska slika

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

*Vir: ARSO; ponedeljek, 25. avgust 2025 ob 11:00

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Varstvo oljne ogrščice

Varstvo pred plevli

Po dolgotrajnem suhem in izrazito vročinskem obdobju smo končno dočakali nekaj malo dežja, kar bo tudi omogočilo optimalnejše pogoje za pripravo tal in sam vznik oljne ogrščice. S setvijo seveda ni potrebno hiteti, saj smo v zadnjih letih priča dolгим in toplim jesenim, ki omogočajo zelo dober razvoj mladih rastlinic do zime. Tla za setev je potrebno dobro pripraviti, saj le tako dosežemo odličen vznik, enakomeren sklop in s tem zagotovimo potencial za dober pridelek. Dober sklop hkrati zagotavlja tudi manjši pritisk plevelov in lažje obvladovanje le-teh, enakomeren vznik pa nam da izenačene rastline, ki zagotavljajo višji pridelek. **Priporočilo:**

- **Centium 36 CS v odmerku 0,25 L/ha takoj po setvi** in najkasneje 3 dni po setvi za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov, predvsem **navadnega srakoperca ali pahovke**, pa tudi na smolenca ali plezajoče lakote.
- **Belkar v odmerku 0,25 L/ha**, od fenološke faze, ko sta dva lista razvita, pa do fenološke faze, ko so razviti štirje listi. V primeru, da se ponovno pojavijo plevli, se tretiranje ponovi v odmerku 0,25 L/ha, pri čemer naj bo minimalni presledak med tretiranjema 14 dni ali
- **Belkar v odmerku 0,5 L/ha**, od fenološke faze, ko je šesti list razvit, pa do fenološke faze, ko je osmi list razvit. Poraba vode naj bo med 200 do največ 400 L/ha, oba herbicida pa lahko uporabimo v vseh ukrepih.

Zatiranje škodljivcev

V zadnjih letih bolhači pogosto povzročajo težave z obžiranjem mladih rastlinic že ob samem vzniku, zato je potrebno vseskozi spremljati posevek. Prav tako je potrebno biti pozoren na pojav **repne grizlice**, ki lahko v zelo kratkem času povzroči veliko škode. **Priporočilo:**

- **Mavrik 240 EW v odmerku 0,2 L/ha**, ob dodatku sredstva za nižanje kislosti vode **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**.

V primeru deževnega vremena je ob vzniku in takoj po njem potrebno redno pregledovanje njiv na pojav **polžev** (še posebej na zunanjih robovih posevka) in pravočasno ukrepati proti njim. **Priporočilo:**

- **Polžomor-Gusto 3 v odmerku 6 kg/ha**, je odličen limacid z novo formulacijo, ki omogoča peletom še boljše obstojnost na vlago in s tem podaljša čas delovanja in učinkovitost. Prav tako ima dodan tudi atraktant. V začetku pojava njivo samo zarobimo, kasneje pa je potrebno tretiranje cele površine.



Takoj po setvi



Centium 36 CS in Belkar



Mavrik 240 EW in pH minus



Gusto 3 - Polžomor

Foliarna prehrana koruze

Preprečevanje sušnega stresa

Zadnja leta smo priča suhemu vremenu v času vznika in po njem, kar negativno vpliva na sklop posevkov. Res je, da imajo rastlinice v tem času le klična lista in po en razviti list, vendar je to dovolj za sprejem sredstev na osnovi aminokislin, ki imajo sposobnost izredne penetracije in sistemičnosti. **Priporočilo:**

- **Protifert LMW** v odmerku 3,5 L/ha ali
- **Drin** v odmerku 1,0-1,25 L/ha.



Fenološka faza 1. pravi list



Protifert LMW in Drin

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen poprh in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin.

V ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L**. Sredstvo je dovoljeno tudi v ekološki pridelavi.



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**. V takem primeru se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres.

Sredstva na osnovi aminokislin:

- **Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Drin** **v odmerku 0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- **Goëmar BM 86**  **v odmerku 3,0 L/ha** (300 mL/hL)
- **ExelGrow**  **v odmerku 1,0 L/ha** (1000 mL/hL)



Protifert LMW in Drin



ExelGrow in Goëmar BM 86

Opomba: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. **Porabo vode prilagodimo vzgojni obliki.**

Splošna priporočila

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.