



Sadjarstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Ponekod na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter, drugod popoldne šibak vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 °C.

Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, najvišje dnevne od 12 do 17 °C.

Obei Tudi v četrtek in petek bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, ki se bo pojavljala tudi ob morju.

Vremenska slika Iznad Sredozemlja sega preko srednje in deloma zahodne Evrope do Skandinavije območje visokega zračnega tlaka. Oslabljen hladna fronta se pomika čez Balkan proti jugovzhodu. V višinah k nam od severozahoda prehodno doteka nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

*Vir: ARSO, torek, 24. februarja 2026 ob 06:00

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. inž. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. inž. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. inž. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. inž. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Varstvo koščičarjev

Zatiranje glivičnih bolezni

Padavine, ki smo jih bili deležni prejšnji konec tedna, bodo sedaj ob dvigu temperatur lepo vzpodbudile vegetacijo, še posebej koščičarjev, ki rastejo na tolplih, sončnih in zaveternih legah.

Najpomembnejše glivične bolezni koščičarjev so **breskova kodravost**, **listna luknjičavost koščičarjev**, **češnjeva listna pegavost**, **cvetna monilija** in **različne sadne gnilobe** ter **bakterioze**.

Brsti zgodnjih breskev in nektarin so ponekod že lepo nabrekli in če pogledamo od blizu vidimo, da so se luskolisti premaknili in za njimi je svetlo rdečkasto nezaščiteno tkivo. Prav tukaj lahko ob prvih padavinah že pride do okužbe z **breskovo kodravostjo**. Na češpljah in slivah se ta bolezen kaže kot **rožičavost sliv**, kjer so plodovi deformirani v obliki rožiča in neuporabni. **Listna luknjičavost koščičarjev** prav tako lahko okuži koščičarje že v fazi brstenja, predvsem v hladnem in mokrem vremenu, zato mora biti zaščita pravočasna. **Priporočilo:**

- za zmanjšanje okužb z **listno luknjičavostjo** in **gnilobami** priporočamo uporabo **bakrenega fungicida Badge WG**  **v odmerku 3,5 kg/ha (35 g/10 L vode)**. Uporabljamo ga lahko dokler niso vidni zeleni listni vršički, rjave luske pa so odpadle in so brsti obdani s svetlozelenimi luskami. Zaščito opravimo vedno pred dežjem.
- za zmanjšanje okužb breskev in nektarin z **breskovo kodravostjo** je predvsem važno zgodnje oz. pravočasno ukrepanje in to vedno pred nastopom padavin. Prvi termin preventivne zaščite z bakrenimi fungicidi je v fazi, ko se luskolisti premaknejo in je viden "rdeči prstan". Nadaljne preventivne ukrepe do konca cvetenja izvajamo z uporabo organskega fungicida **Syllit 400 SC v odmerku 2,25 L/ha (22 mL/10 L vode)**, ki ga uporabimo vedno pred dežjem, saj kurativnega delovanja nima noben fungicid. Vedeti moramo, da je breskova kodravost najnevarnejša glivična bolezen breskev in nektarin, ki lahko v toplih in vlažnih pomladih povzroči močne okužbe na listih, ki so popolnoma deformirani in nesposobni asimilacije, zato so drevesa podhranjena, plodiči odpadejo, les jeseni ni dozorel in je močno podvržen pozebi; drevesa lahko zaradi tega tudi propadejo.

Opomba: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha.



Fenološka faza, ko se pojavi rdeči prstan



Breskova kodravost



Rožičavost sliv



Syllit 400 SC (100 mL in 1 L) in Badge WG

Varstvo in prehrana koščičarjev

Varstvo marelic

Vreme bi se naj v prihodnjih desetih dnevih kar otoplilo, kar bo seveda ugajalo marelicam, ki lahko hitro zacvetijo. V primeru vlažnega vremena lahko kaj hitro pride do okužbe s **cvetno monilijo**, zato jih je potrebno preventivno zaščititi. Bakrene fungicide uporabljamo od faze, ko so prvi lističi oddvojeni, kasneje v času tik pred, med in takoj po cvetenju pa biotične fungicide. **Priporočilo:**

- **Amylo-X v odmerku 1,5-2,5 kg/ha** (150-250 g/hL) za zatiranje **cvetne monilije**. Sredstvo v vodo za škropljenje vsipavamo zelo počasi ob konstantnem mešanju, da ne bi prišlo do pojava grudic.



Cvetna monilija

Zatiranje škodljivih pršic

Pršice prelke so redek pojav na koščičarjih, vendar se lahko pojavijo v nasadih s prekomerno uporabo piretroidnih insekticidov, ki uničijo koristne ali predatorske pršice. **Priporočilo:**


- če na večletnem lesu odkrijemo **zimsko jajčeca rdeče sadne pršice**, lahko v fazi od pričetka nabrekanja cvetnih brstov, ko so brsti še zaprti in so vidne svetlorjave luske, pa do faze, ko je socvetje obdano s svetlozelenimi luskami, uporabimo akaricid na osnovi parafinskega olja **Belo olje Karsia v odmerku 10 L/vmk/ha** (višinski meter krošnje) (200 mL/10 L vode; uporaba 1-krat letno).

Opomba: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha.

Foliarna prehrana koščičarjev

Foliarna gnojila s stimulaturnimi učinki se uporabljajo na koščičarjih za preprečevanje **stresnih situacij, predvsem zmrzali in ciljno za boljšo oplodnjo in višji ter kvalitetnejši pridelek. Priporočilo:**

- **Protifert LMW v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL) ali **Drin v odmerku 1,5 L/ha** (150 mL/hL) za dvig odpornosti proti nizkim temperaturam;
- **ExelGrow v odmerku 1,0 L/ha** (100 mL/hL) za preprečevanje stresa, boljšo oplodnjo in višji pridelek;
- **Karsia Cink v odmerku 1,0-2,0 L/ha** (100-200 mL/hL) za aktivacijo encimatskih procesov.



Biotični fungicid Amylo-X



Drin in Protifert LMW



ExelGrow in Karsia Cink

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- v ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/ 100 L vode.**



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**, se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha (350 mL/hL)**
- Drin** **v odmerku 0,4-1,7 L/ha (40-170 mL/hL)**

Sredstva na osnovi morskih alg:

- ExelGrow** **v odmerku 1,0 L/ha (1000 mL/hL)**



Protifert LMW in Drin



ExelGrow

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.