



Poljedelstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 14 °C. Ponoči se bo povsod razjasnilo. V zatišnih legah bo zjutraj lahko slana. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 5 do 9 °C.

Jutri bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastala spremenljiva kopasta oblačnost. Veter bo nekoliko oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 16 °C.

Opozorilo Močna burja bo do danes zvečer v sunkih še dosegala hitrosti okoli 100 km/h, ponoči pa bo nekoliko oslabila.

Obeti V petek bo na Primorskem precej jasno, drugod se bo po dokaj jasnem jutru oblačnost povečala. Jutro bo hladno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, možne bodo občasne krajevne padavine.

Vremenska slika Nad srednjo Evropo in severni Balkan sega iznad Rusije območje visokega zračnega tlaka. Odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka se iznad severnega Jadrana in severne Italije pomika proti jugu. Nad naše kraje od vzhoda doteka nekoliko toplejši, a precej vlažen zrak.

*Vir: ARSO; sreda, 18. marec 2026 ob 13:00

**Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin**

www.karsia.si

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Varstvo oljne ogrščice

Glivične bolezni

Padavine v zadnjih dneh niso bile obilne, a bilo jih je dovolj, da bodo ob dvigu temperatur nastali ugodni pogoji za razvoj bolezni. Oljna ogrščica bo ob dvigu temperatur pričela z aktivnim podaljševanjem stebela in prehajala v razvojno fazo rozete oz. do pojava prvega socvetja. Zato svetujemo vsem pridelovalcem, da takoj ob dvigu temperatur nad 12 °C zaščitijo svoje posevke pred glivičnimi boleznimi kot so **suha trohnoba stebela**, **listna pegavost**, **črna listna pegavost** in **bela gniloba**. **Priporočilo:**

- Sistemski fungicid **Orius 25 EW v odmerku 1 L/ha**. **Orius 25 EW** je standardni in cenovno ugoden fungicid s širokim spektrom delovanja na omenjene bolezni ali
- **Mirador Forte v odmerku 1,5 -2,0 L/ha**, če se še kje najde kakšna zaloga.

Napoved prihodnje ukrepe varstva pred glivičnimi boleznimi

Za zatiranje **bele gnilobe oz. sklerotinije** in **sive plesni** v času, ko je odprtih 10 % cvetov pa do polnega cvetenja ogrščice, moramo posevke oljne ogrščice zaščititi, to pa je nekje 2-3 tedne po prvem škropljenju. Ukrepe izvedemo pred napovedanimi padavinami. **Priporočilo:**

- **Custodia v odmerku 1 L/ha**, ki je na osnovi dveh učinkovin azoksistrobina in tebukonazola ali
- **Soratel v odmerku 0,7 L/ha**, ki je novejši fungicid na osnovi protiokonazola.



Suha trohnoba stebela (foto: Neal Evans)



Listna pegavost



Orius 25 EW in Mirador Forte



Custodia in Soratel

Varstvo oljne ogrščice

Škodljivci

Letošnjo pridelovalno sezono si bomo zapomnili po izredno močnem oz. celo rekordnem naletu kljunotajev, kot prvih škodljivcev v oljni ogrščici. Tudi ulov repičarja v zadnjih dneh ne zaostaja od močnega pojava kljunotajev. Torej, beleži se izredno močan pojav teh škodljivcev, ki lahko ob neukrepanju naredijo veliko škodo.

Ogrščica bo ob dvigu temperatur hitro prehajala v fazo rozete in pojav socvetja in prav v tej razvojni fazi, na še neodprtem socvetju, delajo repičarji največjo škodo, saj izjedajo notranjosti cvetov. Ko bodo socvetja dvignjena nad najmlajšim listom (BBCH 53), je nujno redno dnevno spremljanje posevkov na prisotnost repičarja.

Pragovi zatiranja repičarja:

- socvetje v času razpiranje brstov : 1-2 hrošča/socvetje
- socvetje v času nabreklih brstov : 2-3 hrošči/socvetje,
- socvetje v času pred razcvetanjem prvih cvetov (rumeni brst): 4-6 hrošči/socvetje

Opomba: pri slabših in redkejših posevkih upoštevamo nižje vrednosti. V času polnega cvetenja ogrščice, repičarji ne delajo več škode, ampak takrat celo pomagajo pri opraskanju in zatiranje ni več smiselno.

Priporočilo:

Mavrik 240 EW v odmerku 0,2 L/ha. Je piretroidni insekticid, ki ima najbolj zanesljivo delovanje na repičarja in dobro dela tako pri višjih kot nižjih temperaturah.

Za optimalno učinkovitost se priporoča **zakisanje vode** s sredstvom **pH minus v odmerku 44-108 mL/hL** in dodajanje močila **Nu-Film-Premium  v odmerku 30 mL/hL.**



Repičar



Mavrik 240 EW - 200 mL in 1 L



pH minus in Nu-Film-Premium

Foliarna prehrana oljne ogrščice

Bor

V tem času posevki ogrščice potrebujejo veliko **bora**, ki pri intenzivni rasti stebela preprečuje njegovo pokanje, močno pa vpliva tudi na razvoj cvetov, da se bodo le-ti kasneje tudi dobro oplodili. **Priporočilo:**

- **Karsia Bor**  **1,5-2,5 L/ha**
- **Protifert Bor**  **v odmerku 2-3 L/ha**

Žveplo

Je hranilo, ki ga križnice potrebujejo za tvorbo olja. Žveplo lahko dodajamo preko tal ali pa tudi preko lista, foliarno, kjer se hranilo hitro vsrka v rastlino in prične učinkovati. **Priporočilo:**

- **Karsia ATS** **v odmerku 5 L/ha**
- **Karsia Žveplo**  **v odmerku 3-5 L/ha**

Dušik

V fazi intenzivne rasti rastline potrebujejo dušik. Dodajamo ga lahko tudi foliarno, važno je, da je ta dušik hitro sprejemljiv in da se sprošča daljše obdobje. V primeru foliarnega dognovanja z dušikom ne pride do spiranja v primeru močnejših padavin in slabšega izkoristka v primeru suhega vremena. **Priporočilo:**

- **Nitro Speed Total** **v odmerku 5-15 L/ha**, ki je hitro sprejemljivo in počasi sproščujoče dušično foliarno gnojilo z dodatkom žvepla in magnezija ter mikrohranili.

Za **stimuliranje rasti, boljše oplodnje, povečevanje pridelka ter zmanjševanje stresa** svetujemo dodajanje biostimulanta na osnovi morskih alg ali foliarnih gnojil na osnovi aminokislin. **Priporočilo:**

- **ExelGrow** (morske alge) **v odmerku 0,5 L/ha**, od pričetka vegetacije pa do pričetka cvetenja
- **Protifert LMW**  (aminokisline) **v odmerku 3,5 L/ha**
- **Drin** (aminokisline) **v odmerku 0,8-1,25 L/ha**.



Pokanje stebel - pomanjkanje bora



Karsia Bor in Protifert Bor



Karsia ATS in Karsia Žveplo



Nitro Speed Total in ExelGrow

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- v ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/ 100 L vode.**

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- pH minus** v odmerku **44-104 mL/ 100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**, se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha (350 mL/hL)**
- Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha (40-170 mL/hL)**

Sredstva na osnovi morskih alg:

- ExelGrow** v odmerku **0,5-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)**



Nu-Film-Premium



pH minus



Protifert LMW in Drin



ExelGrow

Splošna priporočila

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.