

Vse informacije v škropilnih programih so zgolj informativnega značaja. Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte preudarno in varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo ter priložene informacije oziroma navodilo za uporabo. Naša priporočila temeljijo na izkušnjah in številnih poskusih.

Nasveti so pripravljeni na podlagi najnovejših spoznanj, vendar brez jamstva, saj na uporabo in shranjevanje sredstev nimamo vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne odgovarjamo.

Ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si


Januar 2026

Varstvo in foliarna prehrana koščičarjev

Orientacijski škropilni programi 2026

KARSIA®

Svetovanje





Andrej Kos
univ. dipl. inž. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. inž. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si



Marjan Kragl
univ. dipl. inž. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si



Drago Majcen
univ. dipl. inž. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si



Kristjan Auguštin
dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641
kristjan.augustin@karsia.si



Varstvo breskev in nektarin

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	zimska jajčeca pršic prelk	Belo olje Karsia	3 %	300 mL	max 30 L
	listna luknjičavost, gnilobe	Badge WG	0,35 %	35 g	3,5 kg
	breskova kodravost	Syllit 400 SC	0,225 %	22 mL	2,25 L
	spomladanska pozeba, boljša oploditev	Protifert LMW Drin ali ExelGrow	0,35 % 0,15 % 0,1 %	35 mL 15 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 1,0 L
	breskov molj	Lepinox Plus	0,1 %	10 g	1,0 kg
	cvetna monilija, bakterijski rak koščičarjev	Amylo-X	0,15-0,25 %	15-25 g	1,5-2,5 kg
	breskova kodravost	Syllit 400 SC	0,225 %	22 mL	2,25 L
	pepelovka	Colpenn 80 WG Vertipin	0,5-0,75 % 0,5 %	50-75 g 50 mL	5,0-7,5 kg 5,0 L
	breskov zavijač	Ecodian CM	2.000-2.500 dispenzerjev/ha		
	cvetlični resar	Laser Plus	0,025 %	2,5 mL	250 mL
	siva breskova uš	Mospilan 20 SG Pirimor 50 WG	0,0375 % 0,075 %	3,75 g 7,5 g	375 g 750 g
	marmorirana smrdljivka	Mospilan 20 SG	0,0375 %	3,75 g	5375 g
	sadna muha, resarji	Naturalis	0,15-0,2 %	15-20 mL	1,5-2 L
	navadna sadna gniloba	Amylo-X Karbicure	0,15-0,25 % 0,5 %	15-25 g 50 g	1,5-2,5 kg 5,0 kg
	breskov zavijač	Ecodian CM	2.000-2.500 dispenzerjev/ha		
	breskov zavijač, breskov molj	Laser Plus Lepinox Plus	0,025 % 0,1 %	2,5 mL 10 g	250 mL 1,0 kg
	plodova vinska mušica	Laser Plus	0,025 %	2,5 mL	250 mL
	breskova kodravost v fazi odpadanja listja	Syllit 400 SC	0,225 %	22 mL	2,25 L
	listna luknjičavost, gnilobe	Badge WG	0,35 %	35 g	3,5 kg
	ožig breskove skorje, pegavosti in luknjičavosti	Delan 700 WG	0,075 %	7,5 g	0,75 kg
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost	Nu-Film-Premium	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox plus)	pH minus	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	

Varstvo marelic

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	zimska jajčeca pršic prelk	Belo olje Karsia	3 %	300 mL	max 30 L
	listna luknjičavost, cvetna monilija	Badge WG	0,35 %	35 g	3,5 kg
	cvetna monilija	Amylo-X	0,15-0,25 %	15-25 g	1,5-2,5 kg
	spomladanska pozeba, boljša oploditev	Protifert LMW Drin ali ExelGrow	0,35 % 0,15 % 0,1 %	35 mL 15 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 1,0 L
	sadna gniloba	Amylo-X Karbicure	0,15-0,25 % 0,5 %	15-25 g 50 g	1,5-2,5 kg 5,0 kg
	pepelovka	Colpenn 80 WG Vertipin	0,5-0,75 % 0,5 %	50-75 g 50 mL	5,0-7,5 kg 5,0 L
	breskov zavijač, breskov molj, cvetlični resar	Laser Plus	0,025 %	2,5 mL	250 mL
	listne uši, marmorirana smrdljivka	Mospilan 20 SG	0,0375 %	3,75 g	375 g
	marmorirana smrdljivka		0,05 %	5 g	500 g
	sadna muha, resarji	Naturalis	0,2 %	20 mL	2,0 L
	plodova vinska mušica	Laser Plus	0,025 %	2,5 mL	250 mL
	glivične, bakterijske bolezni	Badge WG	0,35 %	35 g	3,5 kg
	ožig breskove skorje, pegavosti in luknjičavosti	Delan 700 WG	0,075 %	7,5 g	0,75 kg
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost	Nu-Film-Premium	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi insekticidov)	pH minus	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	

Varstvo češenj

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	zimska jajčeca pršic prelk	Belo olje Karsia	3 %	300 mL	max 30 L
	listna luknjičavost, cvetna monilija, bakterioze	Badge WG	0,35 %	35 g	3,5 kg
	spomladanska pozeba, boljša oploditev	Protifert LMW Drin ali ExelGrow	0,35 % 0,15 % 0,1 %	35 mL 15 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 1,0 L
	češnjeva listna pegavost	Merpan 80 WDG	0,225 %	22 g	2,25 kg
	cvetna monilija	Amylo-X	0,15-0,25	15-25 g	1,5-2,5 kg
	češnjeva listna pegavost, listna luknjičavost	Merpan 80 WDG Syllit 400 SC	0,225 % 0,19 %	22 g 19 mL	2,25 kg 1,9 L
	sadna gniloba	Amylo-X	0,15-0,25	15-25 g	1,5-2,5 kg
	češnjeva muha, marmorirana smrdljivka	Mospilan 20 SG	0,0375 %	3,75 g	375 g
	češnjeva muha (škropimo v času, ko plodovi pričnejo spreminjati barvo iz zelene v rumeno barvo ali takoj po prvem ulovu na rumene lepljive plošče)	Mospilan 20 SG Naturalis + Nutrel (beljakovinska vaba)	0,0375 % 0,20 % 1,5 %	3,75 g 20 mL 150 mL	375 g 2,0 L
	plodova vinska mušica	Laser Plus	0,015 %	1,5 mL	150 mL
	listna luknjičavost	Badge WG	0,35 %	35 g	3,5 kg
	ožig breskove skorje, pegavosti in luknjičavosti	Delan 700 WG	0,075 %	7,5 g	0,75 kg
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost	Nu-Film-Premium	0,03 %	3 mL/10 L	

Varstvo sliv in češpelj

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	zimska jajčeca pršic prelk	Belo olje Karsia	3 %	300 mL	max 30 L
	listna luknjičavost, cvetna monilija, rožičavost	Badge WG	0,35%	35 g	3,5 kg
	spomladanska pozeba, boljša oploditev	Protifert LMW Drin ExelGrow	0,35 % 0,15 % 0,1 %	35 mL 15 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 1,0 L
	cvetna monilija	Amylo-X	0,15-0,25 %	15-25 g	1,5-2,5 kg
	pepelovka	Colpenn 80 WG	0,5-0,75 %	50-75 g	5,0-7,5 kg
	češpljeva grizlica, listne uši	Mospilan 20 SG	0,0375 %	3,75 g	375 g
	sadna muha, resarji	Naturalis	0,15-0,2 %	15-20 mL	1,5-2 L
	češpljev in sadni zavijač	insekticid			
	listne uši, marmorirana smrdljivka	Mospilan 20 SG	0,0375 %	3,75 g	375 g
	sadna gniloba	Amylo-X	0,15-0,25 %	15-25 g	1,5-2,5 kg
	glivične in bakterijske bolezni	Badge WG	0,35 %	35 g	3,5 kg
	ožig breskove skorje, pegavosti in luknjičavosti	Delan 700 WG	0,075 %	7,5 g	0,75 kg
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost	Nu-Film-Premium	0,03 %	3 mL/10 L	

Foliarna prehrana koščičarjev

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	dodajanje bora v tla	Karsia Bor	4-5 L/ha - v tla vsaka 2-3 leta ali 1,0 L/ha - letno		
	aktivacija encimatskih procesov	Karsia Cink	0,1-0,2 %	10-20 mL	1,0-2,0 L
	prehrana z bakrom	Karsia Baker	0,2-0,3 %	20-30 mL	2,0-3,0 L
	pospeševanje rasti	Karsia ATS Proteoboom	0,5 % 0,3-0,4 %	50 mL 30-40 g	5 L 3-4 kg
	aktivacija rezervnih snovi in korenin	Karsia Fosfor	0,3-0,5 %	30-50 mL	3,0-5,0 L
	preprečevanje stresa, izboljšanje oploditve	Protifert LMW Drin ExelGrow	0,35 % 0,15 % 0,1 %	35 mL 15 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 1,0 L
	izboljšanje oploditve	Karsia Bor Protifert Bor	0,1% 0,2-0,25 %	10 mL 20-25 mL	1,0 L 2,0-2,5 L
	hitrejši razvoj plodov z večjim številom celic, preprečuje pokanje plodov, boljša obarvanost in skladiščna sposobnost	Karsia Fosfor Hascon M10 AD	0,3-0,5 % 0,3-0,5 %	30-50 mL 30-50 mL	3,0-5,0 L 3,0-5,0 L
	izboljšanje fotosinteze	Protifert Magnezij ali Magnesiogreen	0,2-0,3 % 0,25-0,45 %	20-30 mL 25-45 g	2,0-3,0 L 2,5-4,5 kg
	doseganje zadostne količine kalcija v plodovih, višja trdota plodov, izboljšan okus plodov	Protifert Kalcij Karsia Kalcij	0,2-0,4 % 0,5 %	20-40 mL 50 mL	2,0-4,0 L 5,0 L
	pomanjkanje železa	Protifert Železo	0,2-0,3 %	20-30 mL	2,0-3,0 L
	pospešeno dozorevanje, višji sladkorji	Hascon M10 AD Protifert Kalij Proteoleaf	0,3-0,5 % 0,3 % 0,4 %	30-50 mL 30 mL 40 g	3,0-5,0 L 3,0 L 4,0 kg
	pred odpadom listja	Karsia Bor Protifert Bor + Karsia Cink + Karsia ATS	0,1 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,5 %	10 mL 20-25 mL 20 mL 50 mL	1,0 L 2,0-2,5 L 2,0 L 5,0 L